



КЛС №15 от 23.12.2014

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
лекарственного средства
ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА
(ABSINTHII HERBA)

Торговое название. Полыни горькой трава.

Общая характеристика:

международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

основные физико-химические свойства: цветочные корзинки, кусочки стеблей и листьев различной формы, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстий 5600 мкм. Цвет серовато-зеленый. Запах ароматный, своеобразный, сильный.

Форма выпуска. Измельченное сырье.

Состав. Полыни горькой трава, 50,0 г.

Фармакотерапевтическая группа. Лекарственное средство для повышения аппетита.

Фармакологические свойства. Настой полыни горькой травы рефлекторно усиливает секрецию желудочного сока, оказывает желчегонное действие, способствует повышению аппетита.

Показания к применению. *Внутрь:* в комплексной терапии функциональных расстройств пищеварительного тракта (отсутствие аппетита, диспепсия).

Способ применения и дозировка. 2-3 г (1 чайная ложка) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей водяной бане 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь 3 раза в день по 1/3 стакана для повышения аппетита за 30 минут до еды, при диспепсии – после еды. Перед употреблением настой рекомендуется взбалтывать.

Не принимать более 2 недель.

Продолжительность приема определяется врачом индивидуально с учетом характера заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

Побочное действие. Аллергические реакции, изжога, диарея, тошнота, рвота (при длительном применении).

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к лекарственному средству, а также к растениям семейства астровых (сложноцветных), таким как, арника, амброзия, пижма, ромашка, астра, хризантема. Повышенная желудочная секреция, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, обструкция желчевыводящих путей, холангит, заболевания печени. Беременность, период лактации. Детский возраст до 18 лет.

Передозировка. При передозировке оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему (головная боль, головокружение, тремор, судороги, галлюцинации).

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Между курсами приема полыни горькой следует делать перерывы до 2 месяцев. Пациентам с желчнокаменной болезнью и заболеваниями желчевыводящих путей перед приемом лекарственного средства необходимо проконсультироваться с врачом.

Не следует принимать лекарственное средство более 2 недель.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния необходимо обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Прием препаратов травы полыни может повлиять на эффекты лекарственных средств, действующих через GABA рецепторы.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Применение у детей. Применение у детей в возрасте до 18 лет не рекомендовано в связи с отсутствием достаточных данных.



Применение во время беременности и кормления грудью. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Влияние на возможность вождения автомобиля и работу с техникой. Прием лекарственного средства может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с механизмами. В случае возникновения нарушений со стороны нервной системы пациентам не следует управлять автотранспортом и работать с движущимися механизмами.

Условия хранения. Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.

Условия отпуска из аптек. Без рецепта.

Срок годности. 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!

Упаковка. В пакеты бумажные по 50,0 г. По 1 пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачки из картона. Допускается каждую пачку из картона упаковывать в пленку полипропиленовую.

Производитель. ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цнянка, военный городок 137«А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.