



**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**(информация для пациента)**  
**лекарственного средства**  
**БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ**  
*(LEDI PALUSTRIS CORMUS)*

**Торговое название.** Багульника болотного побеги.

**Общая характеристика:**

*международное непатентованное название (МНН).* Отсутствует.

*основные физико-химические свойства:* смесь кусочков побегов, листьев и небольшого количества плодов, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 4000 мкм. Цвет зеленый, темно-зеленый, оранжево-коричневый, серовато-коричневый. Запах резкий, специфический.

**Форма выпуска.** Измельченное сырье.

**Состав.** Багульника болотного побеги, 75,0 г.

**Фармакотерапевтическая группа.** Отхаркивающие средства.

**Фармакологические свойства.** Средство растительного происхождения, обладает отхаркивающим и противовоспалительным действием. Оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему и миоэпителий.

**Показания к применению.** В качестве отхаркивающего средства в комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей у взрослых (фарингит, ларингит, трахеит, бронхит).

**Способ применения и дозировка.** 10 г (2 столовые ложки) побегов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл кипяченой воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, затем охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослые принимают внутрь в теплом виде по 1/4 стакана 2-3 раза в день после еды. Перед употреблением настоя рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного средства.

**Побочное действие.** Возможны аллергические реакции, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (рвота, гастроэнтерит, диарея) и мочевыводящих путей. Лекарственное средство может вызывать нарушения со стороны центральной нервной системы: головокружение, повышенную нервную возбудимость, при приеме больших доз – возбуждение или угнетение центральной нервной системы.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием настоя и обратиться к врачу.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства. Беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет; гепатит, панкреатит, гломерулонефрит.

**Передозировка.** Признаками передозировки лекарственного средства являются симптомы возбуждения центральной нервной системы, которое может привести к развитию мышечных спазмов, судорог и нарушению дыхания, раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (рвота, гастроэнтерит, диарея), паренхимы почек и мочевыводящих путей. При появлении признаков передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое. Необходим мониторинг функции почек, может потребоваться интубация и кислородотерапия.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Не следует одновременно принимать настой побегов багульника с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание мокроты.

**Влияние на способность управления автомобилем и работу с движущимися механизмами.** В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Применение во время беременности и кормления грудью.** Противопоказано применять лекарственное средство во время беременности и кормления грудью. Настой побегов багульника оказывает стимулирующее действие на миометрий.

**Применение у детей.** Применение у детей до 18 лет противопоказано.

**Меры предосторожности.** Применение лекарственного средства только по назначению врача.

**Особенности применения.** Настой принимают в теплом виде после еды. Если во время применения настоя симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

**Условия хранения.** Хранить в защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Приготовленный настой – в прохладном месте (при температуре от 8 °С до

15 °С) не более 2 суток.

**Условия отпуска из аптек.** По рецепту врача.

**Срок годности.** 3 года.



*Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!*

**Упаковка.** В пакеты бумажные по 75,0 г. По 1 пакету бумажному вместе с листком-вкладышем помещают в пачки из картона. Допускается упаковывание каждой пачки из картона в пленку полипропиленовую.

**Производитель.** ЗАО «БелАсептика», Республика Беларусь, Минский район, деревня Цнянка, военный городок 137«А», административное здание ЗАО «БелАсептика», комната 7. Тел. (017) 500 33 11, тел./факс (017) 500 33 46.