



ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(информация для пациента)
лекарственного средства
МОЧЕГОННЫЙ СБОР №2
(SPECIES DIURETICAE №2)

Торговое название. Мочегонный сбор №2.

Международное непатентованное название (МНН). Отсутствует.

Форма выпуска. Сбор.

| Состав лекарственного средства: | на 100 г | на 250 г |
|--|----------|----------|
| Толокнянки листья измельченные | 40 г | 100 г |
| Можжевельника плоды цельные | 40 г | 100 г |
| Солодки корни измельченные | 20 г | 50 г |

Общая характеристика:

основные физико-химические свойства: смесь кусочков листьев, корней различной формы, проходящих сквозь сито с номинальным размером отверстия 2800 мкм и цельных плодов. Цвет от светло-зеленого до темно-зеленого со светло-желтыми, фиолетово-коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный.

Фармакотерапевтическая группа. Прочие средства, применяемые для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ: G04BX.

Фармакологические свойства. Биологически активные вещества, входящие в состав компонентов сбора, оказывают диуретическое, умеренное противовоспалительное и противомикробное действие.

Показания к применению. В комплексной терапии заболеваний мочевыводящих путей после консультации врача.

Способ применения и дозы. Около 5 г (1 столовая ложка) сбора помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 30 мин, процеживают не охлаждая, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл. Принимают внутрь в теплом виде: взрослые – по ¼ стакана отвара 3-4 раза в день. Перед употреблением отвар рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого терапевтического эффекта и

переносимости лекарственного средства.

Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит, пиелит, пиелонефрит, заболевания, при которых необходимо ограничение приема жидкости (например, тяжелые заболевания сердца или почек), беременность, период лактации, детский возраст до 18 лет. С осторожностью применять при нефроуролитиазе.

СОГЛАСОВАНО
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Приказ Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

Побочное действие. Аллергические реакции, тошнота, рвота, диарея, боли в эпигастрии, окрашивание мочи в темно-зеленый цвет.

При длительном применении возможно раздражение почечных лоханок, обострение заболеваний почек, в связи с содержанием корня солодки возможно развитие задержки жидкости в организме, гипокалиемии, артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, гипертонической энцефалопатии.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Передозировка. При длительном применении возможно обострение воспалительного процесса в почках и мочевыводящих путях, в связи с содержанием корня солодки возможно развитие задержки жидкости в организме, гипокалиемии, артериальной гипертензии, нарушения ритма сердца, гипертонической энцефалопатии.

В случае однократного приема в больших дозах или длительного приема плодов можжевельника могут развиваться боли в области почек, усиленный диурез, альбуминурия, гематурия, желудочно-кишечные расстройства, ускоренное сердцебиение и повышение артериального давления. Имеются данные о редких случаях развития симптомов гиперстимуляции центральной нервной системы (судороги), а также маточных кровотечений и прерывания беременности.

В случае появления симптомов передозировки необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Меры предосторожности. Перед применением лекарственного средства необходима консультация врача. В связи с наличием в составе корня солодки следует применять с осторожностью у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями печени. Во время лечения рекомендуется соответствующее потребление жидкости. Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, появляются расстройства мочеиспускания, боли спастического характера, кровь в моче), необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Не применять одновременно со средствами, закисляющими мочу. Не рекомендуется

